




艾滋病的母婴阻断

成都市妇女儿童中心医院 产科 罗丹



HIV母婴传播的危险性及传播时间估计



总传播率	非母乳喂养	20-25 %
	母乳喂养 (6个月)	25-30 %
	母乳喂养 (18-24月)	30-35 %



初次就诊

所有育龄妇女
在**每次就诊时**

怀孕妇女在
初次就诊时

均应了解有无可能
感染HIV的相关信息

本人/配偶有
高危行为

没有
高危行为



孕产期保健目的与要求

分期	保健目的与要求
孕早期	及早发现HIV感染的孕产妇
孕中期	加强产前保健、注意监测胎儿宫内发育、及早确定抗病毒治疗方案 为HIV感染的孕产妇和所生婴儿备好孕期、分娩及产后需用的抗病毒药物
孕晚期	指导HIV感染孕产妇及时服用抗病毒药物，提供婴儿喂养的咨询
产时	按照用药方案继续产时用药 提供安全助产服务 指导母乳喂养，坚持早接触、早吸吮、早开奶 评估、建议人工喂养
产褥期	安全处理HIV感染产妇的恶露和排泄物 建议正确和坚持使用安全套，既预防性传播疾病或HIV感染，又可避孕 选择人工喂养的母亲回奶要注意的问题 乳房的护理：乳头疼痛、乳头皲裂、乳房肿胀、乳腺炎、乳腺脓肿



询问/查看记录	检查	症状/体征/结果	诊断分类	处理和建议
没有高危行为	HIV抗体检测 检测结果 阳性 ： HIV确证试验 阳性	有感染征象	艾滋病病人	对阳性妇女提供关爱和支持
	没有感染征象	HIV感染者		
	检测结果阴性	没有感染征象	正常	HIV抗体检测阴性结果的咨询，强调保持阴性结果的重要性
	拒绝检测		动员检测，强调避免感染HIV的危险行为	



询问/查看记录	检查	症状/体征/结果	诊断分类	处理和建议
本人和/或配偶有感染HIV的高危行为	HIV抗体检测 检测结果 阳性 : HIV确证试验阳性 有条件地区进行CD4和病毒载量的测定	是否有下列选项中的两项感染征象: → 体重减轻 → 发热超过1个月 → 腹泻超过1个月 或 一个上述症状或更多的其他症状，或有高危行为	艾滋病病人	对阳性妇女提供关爱和支持
		没有感染征象	HIV感染者	
	检测结果阴性	没有感染征象	正常	HIV抗体检测阴性结果的咨询
	拒绝检测			动员检测，强调避免感染HIV的危险行为



感染孕产妇所面临的问题

- 婚姻危急
- 要孩子？
- 自己的健康、营养
- 照顾感染的丈夫、儿童
- 家庭其他成员和社区的歧视



艾滋病病毒感染妇女、儿童面临的问题

心理
自卑、恐慌...

医疗
可及性、
利用能力

家庭
责任、照顾与
被照顾

社会
社区的歧视
、社会角色...

经济
生活保障、
来源

教育
受教育机
会

感染的妇女 儿童



妊娠结局的选择

- 若决定终止妊娠
 - 建议孕产妇到**正规的**医院接受终止妊娠的手术
 - 在终止妊娠手术结束后，指导其**每次**性生活使用安全套，避免再次非意愿妊娠，以及经性传播HIV的危险
- 若决定继续妊娠
 - 需要采取预防婴儿感染HIV的**措施**，如服用抗逆转录病毒药物、住院分娩和人工喂养等
 - 承担婴儿可能感染的**心理压力**



孕期

- 告诉孕妇开始服药的**最佳孕周**，提醒孕妇到产前检查或准备分娩的医疗机构服用抗病毒药物
- 建议**住院分娩**，并尽早确定分娩地点
- 胎膜早破或先兆临产时**尽快**赶到医院
- 讨论婴儿的**喂养方式**



分娩期

- 应注意：HIV阳性不是剖宫产指征
- 给母亲和婴儿服用药物时要尊重她们的隐私
- 在分娩记录、病历中应记录所有服用的药物名称、用法及服用时间
- 如果孕产妇需转诊，应将服用抗病毒药物情况详细记录在转诊记录中
- 产时发现HIV感染产妇的婴儿喂养问题（尚无确认结果）



分娩期

- 了解和核实孕妇在孕期是否已服用抗病毒药物，服用何种药物（如：AZT，3TC），以及服药的详细情况
- 核实在临产后是否服用了奈韦拉平、齐多夫定、拉米夫定等抗病毒药物
- 根据用药方案继续给予规范的抗病毒治疗
- 提供安全助产，尽量避免侵袭性操作



产后

- 指导安全**处理**被血液污染的卫生巾、被褥和其他物品等的方法（如焚烧、含氯消毒液浸泡等）
- 婴儿**喂养咨询指导**，建议做好乳房保健
- 加强**产后访视**，访视次数和内容；产后42天进行产后检查，对母子情况做出进一步的评估
- 提供**避孕咨询**



避孕咨询

- 解释再次妊娠分娩对孕产妇及婴儿的健康有很大的危险
 - 孕产妇本人的病情加重
 - 在孕期、分娩或母乳喂养时可将HIV传播给胎儿
 - 可发生流产、早产、死产、低出生体重、异位妊娠和其他并发症



避孕咨询

- 与孕产妇及其丈夫探讨选择合适的避孕方式
 - 感染妇女每次性生活时使用安全套是最佳的避孕方法
 - 解释其他避孕措施不适用于HIV感染妇女，如哺乳闭经法、杀精剂、宫内节育器（IUD）、自然避孕法、口服避孕药、避孕针剂或皮下埋植等



HIV/AIDS综合关怀的目的：

延长HIV感染者和艾滋病病人的生命，提高他们的生活质量。



如何对HIV感染孕产妇

提供关爱和支持服务